

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o chirurgii.

Implantologia

Najbardziej trwałą i sprawdzoną metodą uzupełniania braków zębowych w szybkim czasie są implanty. Są to śruby wykonane z tytanu, które zastępują korzeń zęba. Na nich można zamocować pojedynczą koronę protetyczną lub most.

korona



implant

Oferujemy Państwu najwyższej jakości materiały i sprzęty, wyspecjalizowany zespół oraz dożywotnią gwarancję na implant w przypadku wybrania odpowiedniej opcji.

Zalety wszczepienia implantu

Estetyka- korona na implancie idealnie wpasowuje się w cały łuk zębowy, nie odróżnia się od pozostałych zębów ponieważ kolor i kształt jest dobierany indywidualnie do każdego pacjenta i jego warunków w jamie ustnej.

Zdrowie- implant pozwala na zachowanie prawidłowych funkcji żucia, które zmieniają się gdy w jamie ustnej są braki zębowe.

Komfort spożywania pokarmów-ten rodzaj odbudowy protetycznej gwarantuje doskonałą funkcjonalność i swobodę, dlatego możliwe jest spożywanie pokarmów różnego rodzaju.

Trwałość- implant wykonany jest z tytanu, dlatego przy stosowaniu się do zaleceń lekarza, odbywaniu wizyt kontrolnych i higienizacji może służyć przez całe życie.

Wygoda- z racji tego, że implant wszczepiony jest na stałe, nie ma konieczności używania klejów mocujących jak w przypadku protez.

Etapy leczenia implantologicznego

1 wizyta:

Konsultacja specjalistyczna, wykonanie tomografii komputerowej

2 wizyta:

Plan leczenia wraz z umówieniem wizyt

3 wizyta:

Chirurgiczne wszczepienie implantu

4 wizyta:

Osadzenie korony na implancie po 2 miesiącach od zabiegu

Do czego mogą prowadzić braki w uzębieniu?

- problemy trawienne
- przechylenie się zębów
- wady wymowy
- zaburzenia funkcji stawów skroniowo żuchwowych
- zaburzenia estetyki twarzy
- bóle głowy i kręgosłupa
- brak pewności siebie
- większe koszty leczenia w przyszłości

Implanty klasy Premium - Astra Tech Implant System Ev

- różne kształty implantów
- elastyczny protokół nawiercania
- właściwe komponenty protetyczne
- samopozycjonujące się elementy wyciskowe



**DOŻYWOTNIA GWARANCJA
NA IMPLANTY KLASY PREMIUM!**

Treść objęta jest prawami autorskimi.

MOŻLIWOŚCI ODBUDOWY IMPLANTOLOGICZNEJ



Korona na implantcie

To rodzaj odbudowy protetycznej, która uzupełnia pojedynczy ubytek w uzębieniu. Odzworowuje anatomiczny kształt i kolor zęba. Koronę na implantcie osadzamy po około 2 miesiącach po zabiegu implantacji.



Most na implantach

Ten rodzaj odbudowy wykonujemy w przypadku braku kilku znajdujących się obok siebie zębów. Most składa się z kilku połączonych ze sobą koron.



Proteza na implantach

Ten rodzaj uzupełnienia pozwala odbudować cały łuk zębowy. W tym przypadku protezę mocuje się na 4 lub 6 implantach.

Treść objęta jest prawami autorskimi.

Podniesienie zatoki szczękowej

Często przed wykonaniem wszczepienia implantów potrzebne jest podniesienie dna zatoki szczękowej, by implanty mogły znaleźć się we właściwym miejscu w szczęcie.

Jest to zabieg mający na celu podniesienie błony śluzowej zatoki. Zabieg podnoszenia dna zatoki szczękowej może zostać połączony z wprowadzeniem implantów stomatologicznych, jeśli można uzyskać ich stabilizację na wstępnym etapie.

Wskazania do zabiegu:

Wskazaniem może być utrata zębów w bocznym odcinku szczęki, jeśli u pacjenta występuje anatomicznie nisko schodząca zatoka szczękowa. Ta sytuacja powoduje brak odpowiedniej ilości kości pozwalającej na poprawne wszczepienie implantów.

Augmentacja kości

Augmentacja to przeszczep pobranego materiału kostnego lub gotowego materiału. Regeneracja kości jest bezbolesna, przeprowadza się ją w znieczuleniu miejscowym.

Wskazania do zabiegu:



Augmentację kości przeprowadza się w przypadku zaniku kości, przed planowaną implantologiczną odbudową braków zębowych. Innym wskazaniem do zabiegu jest parodontoza czy kieszenie przyzębne.

Przeszczep dziąsła czyli pokrycie recesji

Zabieg polega na pokryciu odsłoniętego korzenia zębowego, poprzez przeszczepienie fragmentu podniebienia lub dziąsła z innego obszaru jamy ustnej.

Wskazania do zabiegu:

Schorzenie do którego dochodzi przez odsuwanie się dziąsła. W ten sposób szyjka zębowa zostaje odsłonięta, a w konsekwencji ząb ulega wydłużeniu. Recesja jest jedną z najbardziej zaawansowanych form choroby dziąseł. Często wykonywany w przypadku implantacji.



Treść objęta jest prawami autorskimi.

Zalecenia po zabiegu podniesienia zatoki szczękowej, augmentacji kości, po przeszczepie dziąseł oraz implantacji

W celu lepszego przebiegu procesu gojenia po zabiegu, zaleca się zapoznanie i stosowanie się do przedstawionych wytycznych.

Po zabiegu implanty zostają najczęściej natychmiast prowizorycznie zaopatrzone. Ostateczne zabezpieczenie następuje po upływie 2 miesięcy po zabiegu. Przy implantach dwufazowych, które zaszyto, to znaczy, kiedy implant nie wystaje z błony śluzowej, implanty zostaną zabezpieczone śrubami zablizniającymi. Dopiero później następuje właściwa rekonstrukcja protetyczna.

- w dniu zabiegu i dwa dni po zabiegu nie palić nie pić alkoholu
- nie wykonywać żadnego wisitku fizycznego
- ograniczyć mówienie
- jeść i pić dopiero po upływie miejscowego znieczulenia
- przyjmować tylko płynne i miękkie pożywienie
- nie gryźć w okolicach implantu
- dbać o pozostałe zęby stosując ścisłą higienę jamy ustnej
- usta w okolicy rany tylko przepłukiwać
- po zabiegu nie należy używać szczoteczki elektrycznej w okolicy rany
- po jedzeniu delikatnie i krótko przepłukać jamę ustną zimną wodą lub płukanka zaleconą przez lekarza
- nie należy dotykać okolic implantu/rany pozabiegowej palcami ani językiem
- w okolicy miejsca zabiegu, policzka i podbródka może wystąpić obrzęk, który po kilku dniach zniknie
- złagodzenie tych objawów można uzyskać stosując zimne okłady

PRF- szybsze gojenie dzięki fibrynie bogatopłytkowej

Czynniki wzrostu zawarte w trombocytach inicjują i przyspieszają procesy naturalnej regeneracji oraz odbudowy tkanek i przyspieszają gojenie.

- szybsze i lepsze rezultaty gojenia
- szybsza odbudowa kości
- lepsza integracja implantu z kością
- brak zespołu suchego zębodołu
- otrzymanie autogennej membrany regeneracyjnej przy implantacji

Treść objęta jest prawami autorskimi.

Zalecenia po usunięciu zęba

- Należy zagryzać tampon przez 30 minut. W przypadku przedłużonego krwawienia można zmienić tampon i ponownie zagryźć na kolejne pół godziny (jałowe tampony dostępne są w każdej aptece).
- W przypadku odczuwalnego bólu i ewentualnego obrzęku można przykładać do policzka zimne okłady.
- Przez 2 h nie można jeść i pić. Przez 24 h nie wolno palić papierosów, spożywać alkoholu, pić gorących płynów, płukać jamy ustnej.
- Wieczorem delikatnie umyć zęby omijając ranę. Skrzep znajdujący się w zębodole jest najlepszym opatrunkiem zapewniającym prawidłowe gojenie rany. Szary nalot na skrzepie jest naturalnym obrazem gojenia.
- Ranę należy delikatnie smarować kilka razy dziennie żelem odkażającym Elugel.
- Po zejściu znieczulenia w razie konieczności można zażyć leki przeciwbólowe (np. Paracetamol, Apap, Ibuprofen, Nurofen, Panadol). Czasami lekarz dentysta przepisuje silniejsze leki przeciwbólowe dostępne na receptę (np. Ketonal, Febrofen). Należy pamiętać o zażywaniu zapisanych leków zgodnie z zaleceniami.
- W przypadku przedłużającego się krwawienia lub wystąpienia po kilku dniach silnego bólu należy jak najszybciej skontaktować się z naszym gabinetem.
- Po usunięciu zęba normalną reakcją jest pojawienie się obrzęku (opuchlizny policzka) i trudności w otwieraniu ust. Objawy mogą się nasilać do 48 godzin po zabiegu, następnie powinny ustępować. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z naszym lekarzem.
- Niewskazany jest wysiłek fizyczny.
- W przypadku założenia szwów, proszę zgłosić się po 7 dniach w celu ich ściągnięcia.



Wszelkie materiały (teksty, treści, zdjęcia) są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy *"Ustawy o prawie autorskim i sprawach pokrewnych"* z dnia 4 lutego 1994r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz.631).

Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub części bez zgody autora jest zabronione.



© Copyright by Paulina Mielnik
CENTRUM STOMATOLOGII WICHROWE WZGÓRZE

Poznań, 30 czerwca 2021 roku